	Rete Ospedaliera SOSD Infezioni correlate all'assistenza	Codice IO.DRO.44	Revisione 0	Pagina 1 di 4
	Istruzione Operativa Indicazioni alla decontaminazione e sanificazione dei setting ambulatoriali per prevenzione della trasmissione da SARS- COV 2			


Decontaminazione e sanificazione dei setting ambulatoriali per prevenzione da SARS-CoV-2

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
10/06/2020	Redattore/Referente Gruppo di redazione Emanuela Spadini Cinzia Melchiori SOSD Infezioni Correlate all'Assistenza	Processo Direttore SOSD Infezioni Correlate all'Assistenza Anna Poli Farmacista Referente Team AID Innocenti Elisabetta Direttore SOC Monitoraggio, Qualità e Accreditamento Rosaria Raffaelli SGQ Direttore SOSD Governance Clinico Assistenziale Mauro Romilio	Direttore Sanitario Aziendale USL Toscana Centro Emanuele Gori Direttore Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale Daniele Mannelli Direttore Rete Ospedaliera Daniela Matarrese Direttore SOSD ICA Anna Poli Direttore Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie Renzo Ricci Direttore Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica Paolo Zoppi

Gruppo di redazione:

- Accorgi Daniela Coordinatrice infermieristica PO S. Stefano
- Andreini Simone PO. Monitoraggio e HTA zona Sud-Est Firenze PO
- Aquilini Donatella Direttore SOS Malattie Infettive PO S. Stefano
- Buccioni David P.O. Monitoraggio SOC Monitoraggio, Qualità e Accreditamento
- Innocenti Elisabetta Farmacia PO S. Maria annunziata
- Melchiori Cinzia Infermiera SOSD ICA
- Patriarca Daniela Coordinatrice infermieristica SOC Outsourcing e App. Consumi
- Poli Anna Direttore SOSD ICA
- Spadini Emanuela Infermiera SOSD ICA

Parole chiave: rischio infettivo, sanificazione, ambulatori, SARS-CoV- 2

	Rete Ospedaliera	Codice	Revisione	Pagina
	SOSD Infezioni correlate all'assistenza Istruzione Operativa Indicazioni alla decontaminazione e sanificazione dei setting ambulatoriali per prevenzione della trasmissione da SARS- COV 2	IO.DRO.44	0	2 di 4

Indice

1. Scopo/ Obiettivi.....	2
2. Campo di applicazione	2
3. Glossario	2
4. Responsabilità e descrizione delle attività.....	2
4.1. Attività di sanificazione svolte dalle ditte in appalto	3
4.2. Attività di decontaminazione delle superfici da parte degli operatori tra un paziente e l'altro	3
5. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione	3
6. Revisione.....	3
7. Riferimenti.....	4
8. Monitoraggio e controllo	4
9. Indice revisioni	4
10. Lista di diffusione	4

1. Scopo/ Obiettivi

Scopo della presente istruzione operativa è garantire la sicurezza e la salute dei pazienti e degli operatori durante le attività ambulatoriali dal rischio di trasmissione da SARS-CoV-2.

2. Campo di applicazione

Il documento si applica a tutto il personale sanitario che a vario titolo effettua nei locali della AUSL TC prestazioni ambulatoriali e alle ditte di pulizia e sanificazione in appalto.

3. Glossario

DECONTAMINAZIONE: Riduce la carica microbica, precede il lavaggio, protegge l'operatore, effettuata con disinfettante antimicrobico ad azione aspecifica e non selettiva, ma di riconosciuta efficacia verso HIV (D.M.28/09/1990).

DISINFEZIONE: Processo che determina la sanificazione ambientale attraverso distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

PPM: Parti per milione.


PULIZIA: Procedimento che rimuove polvere, sporcizia e materiale organico da superfici.

SANIFICAZIONE: Insieme di procedimenti igienizzanti su ambienti, mediante attività di pulizia e disinfezione.

4. Responsabilità e descrizione delle attività

Per svolgere la prestazione in sicurezza è necessario garantire regole comportamentali ed effettuare la corretta decontaminazione/sanificazione ambientale:

1. È necessario contingentare le presenze e limitare gli accompagnatori nel rispetto delle linee guida aziendali dei servizi garantiti.
2. Le superfici degli spazi ambulatoriali devono essere sgombre da materiali e documenti che non possono essere sanificati.
3. Per accedere all'ambulatorio l'utente deve indossare la mascherina chirurgica ed igienizzarsi le mani con gel idroalcolico che deve essere presente in ogni ambulatorio.
4. Rispettare le indicazioni di decontaminazione tra un paziente e l'altro
5. Agevolare lo svolgimento delle attività di sanificazione svolte dalle ditte in appalto

	Rete Ospedaliera	Codice	Revisione	Pagina
	SOSD Infezioni correlate all'assistenza Istruzione Operativa Indicazioni alla decontaminazione e sanificazione dei setting ambulatoriali per prevenzione della trasmissione da SARS- COV 2	IO.DRO.44	0	3 di 4

4.1. Attività di sanificazione svolte dalle ditte in appalto

Le ditte in appalto garantiscono le operazioni di detersione e disinfezione con la frequenza e le modalità definite nel capitolato di gara.

La disinfezione viene effettuata utilizzando ipoclorito di sodio a 1000 ppm.

La frequenza giornaliera degli interventi è in relazione all'orario di apertura degli ambulatori.

La ditta è responsabile della corretta applicazione della metodologia di sanificazione

L'Azienda verifica il processo e il risultato tramite i referenti dei vari setting, gli ADEC e il DEC del contratto.

4.2. Attività di decontaminazione delle superfici da parte degli operatori tra un paziente e l'altro

1. Durante la visita invitare il paziente a limitare i contatti con le superfici.
2. Al termine della visita, garantire un ricambio d'aria, se possibile, decontaminare tutte le superfici che sono entrate in contatto con il paziente (es. lettino, poltrona, maniglia) con movimenti unidirezionali, avendo cura di non passare nuovamente sulle zone precedentemente decontaminate, utilizzando i prodotti di seguito indicati.
3. Decontaminare gli eventuali dispositivi medici/elettromedicali che sono entrati in contatto con il paziente secondo quanto indicato dal produttore nel manuale d'uso.

Le superfici possono essere decontaminate con:

1. Ipoclorito di sodio allo 0,1 % (1000 ppm) – prodotto pronto all'uso -
2. Alcool etilico 70 % – prodotto pronto all'uso -
3. Perossido idrogeno allo 0,5% _ prodotto da diluire (100 ml perossido + 400 ml acqua. Tale soluzione ha la stabilità di 12 ore)-
Tempo di contatto 1 minuto.

In caso di problemi di compatibilità delle superfici con i prodotti elencati può essere utilizzato benzalconio cloruro allo 0,05%, - 0,2 %, avendo presente che è un disinfettante di **dimostrata minore efficacia contro SARS-CoV-2**

I computer, mouse, tablet e telefoni non sono dispositivi medici o elettromedicali e sono di difficile sanificazione per cui è necessario utilizzarli solo con le mani igienizzate. L'uso dei guanti è sconsigliato. Per le tastiere possono essere utilizzate delle "cover" lavabili e sanificabili. È possibile scollegare i PC dall'alimentazione elettrica e sanificare tastiere e video con un prodotto a base di alcool, applicato in precedenza su un pannello monouso.


5. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione

Il presente documento è depositato, insieme all'eventuale storico, presso la SOSD Infezioni correlate all'assistenza. Il redattore provvede a diffondere la presente Procedura con modalità e-mail ai soggetti riportati nella lista di distribuzione, che hanno il compito di diffonderlo, con modalità a cascata, ai collaboratori delle strutture afferenti al proprio ambito di competenza, tenuti a conoscere ed applicare il documento.

Il presente documento è diffuso, inoltre, a tutti attraverso il sito Intranet aziendale.

6. Revisione

Il presente documento verrà revisionato ogni volta che intervengano sostanziali modifiche organizzative o eventuali variazioni nella normativa cogente o di altri documenti ufficiali presi a riferimento e comunque entro 3 anni dalla data di applicazione.

	Rete Ospedaliera	Codice IO.DRO.44	Revisione 0	Pagina 4 di 4
	SOSD Infezioni correlate all'assistenza Istruzione Operativa Indicazioni alla decontaminazione e sanificazione dei setting ambulatoriali per prevenzione della trasmissione da SARS- COV 2			

7. Riferimenti

IO.DS.02 Disposizioni generali emergenza Coronavirus SARS-COV-2
 RAPPORTO ISS COVID-19 N.19 /2020
 RAPPORTO ISS COVID-19 N.20 /2020
 RAPPORTO ISS COVID -19 N.25 /2020
 MINISTERO DELLA SALUTE circolare n.5443 del 22 Febbraio 2020
 Procedura aziendale Guida all'utilizzo degli antisettici e disinfettanti e relativo poster PA.DRO.02
 G.Kampf, D.Todt, S.Pfaender, E. Steinmann "Persistence of Coronaviruses on Inanimate Surfaces and Their Inactivation With Biocidal Agents" J Hosp Infect. 2020 Mar, 104(3): 246-251.

8. Monitoraggio e controllo

La SOSD ICA attuerà il monitoraggio e controllo degli interventi di sanificazione negli ambiti delle attività del Team AID aziendale e di Presidio Ospedaliero. L'indicatore di riferimento è rappresentato dal numero di osservazioni del processo di sanificazione avvenute con esito positivo/ totale osservazioni di sanificazione effettuate x 100. Si considera valore conforme la percentuale superiore al 95%.

La struttura SOC Outsourcing e App. Consumi procederà alla verifica di adesione al processo tramite propria check-list, garantendo una conformità di almeno il 95%.

9. Indice revisioni

Revisione n°	Data emissione	Tipo modifica	Titolo
0	10/06/2020	PRIMA EMISSIONE	

10. Lista di diffusione

Direttore Sanitario Aziendale UTC
 Direttore Rete Sanitaria Ospedaliera
 Direttore Rete Sanitaria Territoriale
 Direttore Dipartimento del Farmaco
 Direttore SePP
 Direttore Medicina Preventiva
 Direttore Dipartimento Infermieristico ed Ostetrico
 Direttore Dipartimento delle Professioni Tecnico- Sanitarie